

Cabatina® Solución Oral

Antihemorrágico

Cabatina® es un producto indicado para el tratamiento de intoxicaciones generadas por rodenticidas anticoagulantes y de procesos hemorrágicos relacionados con la formación defectuosa de los factores de coagulación dependientes de Vitamina K.

Ficha Técnica

Forma farmacéutica

Solución oral.



Acción terapéutica

Antihemorrágico.

Especies de destino

Perros y gatos.

Propiedades

La vitamina K es un cofactor en la última etapa de la síntesis hepática de los factores de la coagulación II (Protrombina), VII (Proconvertina), IX (Componente Tromboplastínico del plasma) y X (Factor de Stuart).

El proceso de formación de factores de coagulación vitamina K dependientes, se puede ver interrumpido por diversas razones, como por ejemplo, enfermedades congénitas, deficiencia de vitamina K como resultado de bajos aportes dietéticos, síndromes de malabsorción, antibioticoterapias de amplio espectro extensas u otros. En Medicina Veterinaria, la causa más frecuente de cese de formación de factores de coagulación K dependientes, es la intoxicación por rodenticidas anticoagulantes.

La Vitamina K1 antagoniza los efectos de los agentes rodenticidas anticoagulantes y permite reactivar el proceso de producción de los factores de coagulación K dependientes.

Composición

Cada 1 mL de producto contiene:

Vitamina K1 (Fitomenadiona).....20 mg

Excipientes c.s.p.....1 mL

Indicaciones de uso

Cabatina® es un producto indicado para el tratamiento de intoxicaciones generadas por rodenticidas anticoagulantes y de procesos hemorrágicos relacionados con la formación defectuosa de los factores de coagulación dependientes de Vitamina K.

Vía de administración

Oral.

Dosis

Dosis del principio activo:

- Perros: 2 mg/Kg de Vitamina K1, una vez al día, durante 3 semanas.
- Gatos: 5 mg/Kg de Vitamina K1, una vez al día, durante 3 semanas.

Dosis del producto:

- Perros: 1mL de Cabatina® por cada 10Kg de peso corporal, una vez al día, durante 3semanas.
- Gatos: 1 mL de Cabatina® por cada 4 Kg de peso corporal, una vez al día, durante 3 semanas.

Recomendaciones

Para mejorar su absorción, se recomienda administrar Cabatina junto con una cucharada de alimento enlatado para perros o gatos.

Advertencias y precauciones especiales de uso

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Este producto no corrige la hipoprotrombinemia resultante del daño hepatocelular.

Interacciones

Las siguientes medicaciones pueden prolongar o potenciar los efectos de los anticoagulantes y antagonizar algunas de las acciones terapéuticas de la Vitamina K1: Fenilbutazona, Aspirina, Cloranfenicol, Sulfonamidas (incluyendo Sulfa/Trimetoprim), Diazóxido, Alopurinol, Cimetidina, Metronidazol, esteroides anabólicos, Eritromicina, Ketoconazol, Propanolol y drogas tiroideas. La administración conjunta de Vaseline puede disminuir la absorción de Vitamina K.

Precauciones para el operador

- En caso de contacto con la piel se recomienda lavar las manos con jabón y abundante agua. Si se desarrolla irritación y ésta persiste, consultar al médico.
- En el caso de contacto con los ojos se recomienda lavar con abundante agua por 15 minutos. Si se desarrolla irritación y ésta persiste, consultar al médico.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito. Obtener ayuda médica.

Contraindicaciones

- No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a la Vitamina K.
- No administrar en animales con insuficiencia hepática severa.

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos. Contactar a la empresa fabricante o a empresas especializadas en la eliminación de residuos, para recibir recomendaciones en la disposición de productos vencidos o no utilizados.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar a temperatura entre 15 y 30°C, protegido de la luz. Una vez abierto, utilizar dentro de 8 semanas. Descartar el producto sin utilizar después de ese período de tiempo.

Condición de venta

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

Observaciones

USO VETERINARIO

Registros

Chile: Reg. SAG N° 2096
Bolivia: Reg. SENASAG PUV-No 009805/21
Perú: Reg. SENASA F.77.32.I.0053
Costa Rica: Reg. N° MV-7129

Presentación

Frasco con 25 mL.

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A
Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.