

Calmedrag®

Ansiolítico

Indicado como tratamiento para la ansiedad por separación. El tratamiento con Calmedrag® debe ser apoyado con terapia de manejo conductual.



Ficha Técnica

Forma farmacéutica

Comprimido oral.

Acción terapéutica

Ansiolítico.

Especie de destino

Perros

Propiedades

La Clomipramina Clorhidrato es un antidepresivo tricíclico que inhibe la recaptación presináptica de Serotonina y de Norepinefrina y con ello produce efectos ansiolíticos, anticomulsivos, antiagresivos y antidepresivos. Como resultado se pueden apreciar cambios significativos en la conducta de los perros sometidos a terapias con Clomipramina.

Composición

Cada comprimido contiene:

Clomipramina Clorhidrato..... 20 mg

(Equivalentes a 17,9 mg de Clomipramina base)

Excipientes c.s.p..... 1 comp.

Indicaciones

Indicado como tratamiento para la ansiedad por separación.

El tratamiento con Calmedrag® debe ser apoyado con terapia de manejo conductual.

Vía y forma de administración

- Vía oral.
- Depositar el comprimido lo más atrás posible en el hocico del perro, mantener el hocico cerrado y estimular la deglución.
- Se recomienda al inicio de la terapia, administrar el producto junto con el alimento para reducir la posibilidad de efectos secundarios como el vómito.

Dosis del principio activo

2 mg de Clomipramina Clorhidrato por kilogramo de peso corporal (2 mg/Kg) cada 12 horas por 2-3 meses

Dosis del producto

1 comprimido de Calmedrag® por cada 10 Kg de peso corporal (1 comp./10 Kg) cada 12 horas por 2-3 meses.
Es recomendable suspender la terapia en forma gradual.

Precauciones

Administrar con precaución en perros con antecedentes de convulsiones, hipomotilidad gastrointestinal, retención urinaria, anormalidades del ritmo cardíaco o incremento en la presión intraocular.

Efectos no deseados

- Los síntomas y signos adversos más frecuentemente observados incluyen náuseas, vómitos y letargia o somnolencia transitoria.
 - La sedación ocurre típicamente al inicio de la terapia y es usualmente autolimitante, tan pronto como los perros llegan a ser tolerantes a ésta.
 - El vómito ha sido reportado especialmente en perros que han recibido Clomipramina con el estómago vacío, por lo que se recomienda administrarla junto con los alimentos.
 - Podría haber, aunque en forma improbable, anorexia, diarrea, hiperactividad de enzimas hepáticas y algunos efectos anticolinérgicos (por ejemplo, boca seca).
-

Sobredosis

La Clomipramina en general es un medicamento bastante seguro y tolerado por los perros. En esta especie las dosis letales son aproximadamente entre 50 y 100 mg/Kg al día por vía oral, es decir 12,5 a 25 veces la dosis terapéutica recomendada. No obstante lo anterior, las sobredosis con antidepresivos tricíclicos son riesgosas para la vida (arritmias, convulsiones, colapso cardio respiratorio).

No existe antídoto conocido para la Clomipramina.

Contraindicaciones

- No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a agentes tricíclicos.
 - No administrar a animales de peso inferior a 2,5 Kg.
 - No administrar a perros machos reproductores.
 - No administrar a hembras preñadas o en lactancia.
 - No administrar a cachorros menores de 6 meses de edad.
 - No administrar en forma concomitante con inhibidores de la MAO (Selegilina, Amitraz).
-

Interacciones medicamentosas

- Debido a los efectos aditivos, la Clomipramina se debe administrar con precaución cuando se emplea en forma concomitante con otros agentes anticolinérgicos o depresores del SNC.
 - Los antidepresivos tricíclicos empleados con agentes antitiroideos pueden incrementar el riesgo potencial de agranulocitosis.
 - La Cimetidina puede inhibir el metabolismo de los antidepresivos tricíclicos e incrementar el riesgo de toxicidad.
 - El uso en combinación con agentes simpaticomiméticos puede aumentar el riesgo de efectos cardíacos (arritmias, hipertensión, hiperpirexia).
 - No administrar en forma concomitante con inhibidores de la MAO (Selegilina, Amitraz).
-

Precauciones del operador

- Lavarse las manos después de manipular y/o administrar el producto.
 - Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
 - La ingesta accidental deberá ser considerada peligrosa.
 - Usar con precaución las personas con sensibilidad conocida a la Clomipramina
-

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

Condiciones de almacenamiento

Conservar en un lugar fresco y seco a temperatura entre 15 y 30°C.

Observaciones

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA RETENIDA

URUGUAY: VENTA EXCLUSIVA BAJO RECETA MSP (RECETA VERDE)

USO VETERINARIO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

Registros

Chile: Reg. SAG N° 2178

Uruguay: Reg. MGAP N° 2017A00466

Bolivia: Reg. SENASAG PUV- no 009999/21

Presentación

Estuche con 30 comprimidos.

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.
