

CEFALEXINA 15%

Antibióticos - Suspensión Oral

Reg. SAG N° 2137 - B

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:
Cefalexina monohidrato 15,78 g
(Equivalente a 15,0 g de Cefalexina base)
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES DE DESTINO

Perros y Gatos.

INDICACIONES DE USO

Indicado para el tratamiento de infecciones de la piel y tejidos blandos en perros y gatos, causadas por gérmenes sensibles a Cefalexina, tales como: *Pasteurella multocida*, *Staphylococcus aureus*, algunas cepas de *Staphylococcus intermedius*, *Staphylococcus epidermidis* y *Streptococcus* spp.

Para el tratamiento de infecciones urinarias causadas por *Klebsiella pneumoniae*; y para el tratamiento de osteomielitis causadas por patógenos sensibles en el perro.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

Infecciones de la piel: 15 - 30 mg de Cefalexina base/kg de peso corporal (equivalente a 0,1 - 0,2 mL de Cefalexina 15%/kg de peso corporal), cada 12 horas, en el perro y en el gato. Para el tratamiento de pioderma superficial, se sugiere continuar el tratamiento por 2 semanas después de la resolución de los signos clínicos, y en los cuadros de pioderma profundo, se recomienda un tratamiento de al menos 6 semanas.

Osteomielitis: 22 - 30 mg de Cefalexina base/kg de peso corporal (equivalente a 0,15 - 0,2 mL de Cefalexina 15%/kg de peso corporal), cada 8 horas, en el perro. Se recomienda un tratamiento de al menos 6 semanas.

Infecciones urinarias: 25 mg de Cefalexina base/kg de peso corporal (equivalente a 0,17 mL de Cefalexina 15%/kg de peso corporal), cada 8 horas en el perro, por 7 días y no más allá de 45 días.

Vía de administración: Vía Oral.

Modo de empleo: Es posible administrar Cefalexina con el alimento ya que no interfiere en su absorción.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

Agitar antes de usar.

Precaución frente al uso conjunto con Aminoglucósidos, diuréticos potentes (Ej. Furosemida), u otras sustancias nefrotóxicas.

Utilizar con precaución en pacientes con antecedentes de enfermedades renales, por el efecto nefrotóxico de las Cefalosporinas.

Una vez abierto, utilizar dentro de 30 días.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al principio activo.

No administrar en animales con insuficiencia renal severa.

No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

EFFECTOS NO DESEADOS Y REACCIONES ADVERSAS

Se pueden presentar los siguientes efectos y/o reacciones: diarrea, dolor abdominal, gastritis, ictericia, náuseas y vómitos. En caso de producirse, suspender el tratamiento y consultar al Médico Veterinario.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30° C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PRESENTACIÓN

Envase de 100 mL.

USO VETERINARIO - Venta bajo Receta Médico Veterinaria

FT0107NAC15072019R1V1

