

Vetoquinol	Nom du produit : Cimalgex 80mg CL
Cr�� par : M.MARQUES	R��f��rence article : 0321 B L
le :	Dimensions : 240x210mm
Visa :	1 couleur
281 U	

APROBADO
SAG
26 Ene 2022



COMPRIMIDO MASTICABLE PARA PERROS

Composici  n:

Cimicoxib 80mg

Cada comprimido masticable contiene:

Cimicoxib80mg

Excipientes csp 1 comprimido

USO VETERINARIO

Especie de destino:

Perros

Indicaciones de uso:

Para el tratamiento del dolor y la inflamaci  n asociado a osteoartritis y el control del dolor perioperatorio debido a la cirug   ortop  dica o tejidos blandos en perros.

Dosis, frecuencia y modo de empleo:

Los comprimidos de Cimalgex   pueden administrarse por v  a oral, con o sin alimento.

Los comprimidos contienen saborizante y la mayor  a de los perros lo ingiere voluntariamente.

La dosis recomendada de Cimicoxib es de 2 mg/kg de peso vivo, una vez al d  a, de acuerdo con la siguiente tabla de dosis:

Peso del perro (kg)	N��mero de comprimidos
	Cimalgex�� 80 mg
18-22	1/2
39-43	1
49-54	1+1/4
55-68	1+1/2

Duraci  n del tratamiento:

- Control del dolor perioperatorio debido a la cirug   ortop  dica o de tejidos blandos: 1 dosis dos horas antes de la cirug  , seguido de 3 a 7 d  as de tratamiento, seg  n la indicaci  n del m  dico veterinario.
- Alivio del dolor e inflamaci  n asociado a osteoartritis: 6 meses.
- Para tratamientos a m  s largo plazo, deber   realizarse una monitorizaci  n regular por el m  dico veterinario.

Contraindicaciones:

No usar en animales menores de 7 meses de edad.

No administrar en animales de peso corporal menor al indicado en la tabla de dosificaci  n.

No usar simult  neamente con corticoesteroides ni con antiinflamatorios no esteroideos (AINEs).

No usar en caso de hipersensibilidad a cimicoxib u otros AINEs.

No usar en perros que sufran trastornos gastrointestinales o trastornos hemorr  gicos.

No administrar en animales con alteraciones cardiacas, hep  ticas y/o renales.

No administrar en animales deshidratados, hipovol  micos o hipotensos, ya que aumenta el riesgo de toxicidad renal.

No usar en animales reproductores, gestantes ni en lactancia.

Efectos adversos y reacciones adversas:

Se han registrado trastornos gastrointestinales leves y transitorios (v  mitos y/o diarrea) muy frecuentemente. En raras ocasiones se observaron trastornos gastrointestinales graves, como hemorragia y formaci  n de   lceras. Otras reacciones adversas como anorexia o letargo pueden observarse tambi  n en raras ocasiones. En muy raras ocasiones se han notificado aumento de los par  metros bioqu  micos renales.

Como en cualquier tratamiento a largo plazo con AINEs, la funci  n renal debe ser monitorizada.

Si alguno de los efectos adversos persiste tras suspender el tratamiento, consulte con su m  dico veterinario.

Si se producen reacciones adversas como v  mitos constantes, diarreas persistentes, sangre oculta en heces, p  rdida repentina del peso, anorexia, letargo o empeoran los par  metros bioqu  micos renales o hep  ticos, se debe interrumpir el uso del medicamento y se debe iniciar monitorizaci  n y/o tratamiento adecuado.

Advertencias y Precauciones especiales de uso e Interacciones:

Se recomienda realizar an  lisis de laboratorio adecuados para establecer los datos basales hematol  gicos y s  ricos antes, y peri  dicamente durante la administraci  n de cualquier AINE por periodos prolongados de tiempo.

Se debe aconsejar a los due  os observar a su perro en busca de signos potenciales de toxicidad al medicamento.

Otorgar periodos sin uso de medicamentos al utilizar otro AINE o corticoesteroides.

Considerar el uso de fluidos parentales durante la cirug  a para disminuir las potenciales complicaciones renales del uso de AINEs prequir  rgico.

Cimalgex   no debe administrarse junto con corticoesteroides u otros AINEs.

El pretratamiento con otras sustancias antiinflamatorias puede resultar en la aparici  n o el aumento de otros efectos adversos y, por esto, deber   observarse un periodo libre de tratamiento con tales sustancias antes del inicio del tratamiento con Cimalgex  . El periodo libre de tratamiento deber   tener en cuenta las caracter  sticas farmacocin  ticas del medicamento veterinario usado previamente.

Precauciones especiales para el operador:

Cimicoxib puede producir sensibilizaci  n cut  nea. L  vase las manos despu  s de la administraci  n.

En caso de ingest  n accidental, consulte con un m  dico inmediatamente, mu  strele el prospecto o la etiqueta.

Las personas con hipersensibilidad conocida a Cimicoxib deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener a temperatura ambiente, entre 15   y 30  C, en ambiente fresco y en su envase original. Cualquier mitad de comprimido deber   conservarse en el bl  ster durante m  ximo dos d  as.

Precauciones especiales para la disposici  n de producto sin utilizar o el material de desecho:

Eliminar envases vac  os junto con los desechos dom  sticos. Producto vencido o restos del mismo, en lo posible, contactar a la empresa importadora por indicaciones para una correcta eliminaci  n.

De acuerdo a la evaluaci  n de riesgo ambiental realizada, el producto presenta una baja exposici  n al medio ambiente debido a que su aplicaci  n est   restringida a tratamientos individuales en animales de compa  a. En conclusi  n, el producto presenta un bajo riesgo medioambiental.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NI  OS Y DE LOS ANIMALES DOM  STICOS.

Venta bajo receta medico veterinaria.

Cimicoxib 8mg - Registro SAG N   2514

Cimicoxib 30mg - Registro SAG N   2515

Cimicoxib 80mg - Registro SAG N   2516

Fabricado por VETOQUINOL S.A., Magny Vernois F-70200 Lure, Francia

Importado y distribuido por CHEMIE S.A.

Suecia 172, pisos 1 y 2, Providencia, Santiago

Bajo licencia de VETOQUINOL S.A., Magny Vernois F-70200 Lure, Francia.

0321 B


APROBADO SAG

26 Ene 2022

Comprimés à croquer pour Chiens - À usage vétérinaire/Kautabletten für Hunde - Für Tiere/Kauwtabletten voor Honden - Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik/Compresse masticabili per Cani - solo per uso veterinario/Μασώμενα δισκία για σκύλους - Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση

Cimalgex 80 mg


Cimicoxib/Cimicoxibum/Cimikoksib/Cimikoksib/Simikoksibi
žvýkačí tablety pro psy - Pouze pro zvířata /Tyggetabletter til hunde - Til dyr/Tyggetablett til hund - Til dyr/Kramtomosios tabletés šunims - Tik veterinariniam naudojimui/Košļājamās tabletes suņiem - Lietošanai dzīvniekiem/Närismistabletid koertele - Ainult veterinaarseks kasutamiseks / Purutabletti koirille - Eläimille



Chewable Tablets for Dogs - For animal treatment only/Comprimidos masticables para Perros - Uso veterinario/Comprimidos mastigáveis para Cães - exclusivamente para uso veterinário/Tabletki do żucia dla psów - Stosować wyłącznie u zwierząt/žuvacie tablety pre psov - Len pre zvieratá

Cimalgex 80 mg

Cimicoxib/Cimicoxibum/Cimikoksib/Cimikoksib/Simikoksibi
Tuggetabletter för hund - För djur/Rágótabletta kutyáknak - Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra/Žvečljive tablete za pse - Samo za živali/таблетки за дъвчене за кучета - Само за ветеринарномедицинска употреба/Comprimato masticabile pentru câini - Numai pentru uz veterinar/Tablete za žvakanje za pse - Samo za primjenu na žvotinjama




Serie:

Elaboración:

Vencimiento:

APROBADO
SAG
26 Ene 2022



VETOQUINOL	Nom du produit : CIMALGEX 80 mg CL	
Créé par : M.MARQUES	Référence article : 0321 C L	
le	Dimensions : 90 x 40 x 135 mm	
Visa :	Quadri	
2747 485 298 YELLOW 130 368 80% 485 NOIR 7740 375		

APROBADO
SAG
26 Ene 2022

195

15

10

SP 10 172D



463880 0621 C

Fabricado por **VETOQUINOL S.A.**, Magny Vernois F-70200 Lure, Francia06

Registro SAG Nº 2516

Mantener a temperatura ambiente, entre 15° y 30°C, en ambiente fresco y en su envase original.

Venta bajo receta médica veterinaria.

USO VETERINARIO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

ver inserto adjunto.

Contraindicaciones, Precauciones especiales para el operador y precauciones especiales para la disposición:

adversas, Advertencias y precauciones especiales de uso e interacciones.

Indicaciones: Indicaciones de uso, Dosis, Modo de empleo, Efectos y reacciones

Contiene: 1 blíster de 8 comprimidos masticables. Perros.

Excipientes csp. 1 comprimido

Cimicoxib . 80 mg

Composición: Cada comprimido masticable contiene:

Cimalgex 80 mg

Fecha de elaboración:

Fecha de vencimiento

Serie:

4°

13.4R

2.5

45°



Cimalgex
Cimicoxib
Comprimido masticable para perros



80 mg



comprimidos
x 8



Cimalgex
Cimicoxib
80 mg

11.4

0.9

0.5



comprimidos
x 8







80 mg

Contiene: 1 blíster de 8 comprimidos



Comprimido masticable para perros
x 8


15°

15

Importado y distribuido por **CHEMIE S.A.**
Suecia 172, pisos 1 y 2, Providencia, Santiago
Bajo licencia de **VETOQUINOL S.A.**, Magny Vernois F-70200 Lure, Francia



03605874542877

VETOQUINOL	Nom du produit : CIMALGEX 80 mg CL
Créé par : P.JARDEL/M.MARQUES	Référence article : 463880 0621 C L
le :	Dimensions : 90 x 20 x 135 mm
Visa :	Quadri
	

RESUMEN CARACTERISTICAS PRODUCTO

1. Denominación del Producto Farmacológico

- Nombre de Fantasía:** CIMALGEX® 80mg
- Nombre Genérico:** Cimicoxib 80 mg
- Forma Farmacéutica:** Comprimido masticable

2. Composición

Cada comprimido masticable contiene:

Cimicoxib..... 80 mg
Excipientes csp 1 comprimidos

3. Particularidades clínicas

- Especie(s) de destino y subcategoría:**
Perros
- Indicaciones de uso, dosis, frecuencia, duración del tratamiento, vía(s) de administración y modo de empleo para cada especie(s) de destino y subcategoría:**

Indicaciones de uso:

Para el tratamiento del dolor y la inflamación asociado a osteoartritis y el control del dolor perioperatorio debido a la cirugía ortopédica o tejidos blandos en perros.

Dosis, frecuencia y modo de empleo:

Los comprimidos de Cimalgex® pueden administrarse con o sin alimento.

Los comprimidos contienen saborizante y la mayoría de los perros lo ingiere voluntariamente.

La dosis recomendada de Cimicoxib es de 2 mg/kg de peso vivo, una vez al día, de acuerdo con la siguiente tabla de dosis:

Peso del perro (kg)	Cimalgex® 80 mg Número de comprimidos
18-22	½
39-43	1
49-54	1 + ¼
55-68	1 + ½

Vía(s) de administración: Vía oral.

Duración del tratamiento:

- Control del dolor perioperatorio debido a la cirugía ortopédica o de tejidos blandos: 1 dosis dos horas antes de la cirugía, seguido de 3 a 7 días de tratamiento, según la indicación del médico veterinario.
- Alivio del dolor e inflamación asociado a osteoartritis: 6 meses.
- Para tratamientos a más largo plazo, deberá realizarse una monitorización regular por el médico veterinario.

26 Ene 2022

c. Contraindicaciones;

No usar en animales menores de 7 meses de edad.

No administrar en animales de peso corporal menor al indicado en la tabla de dosificación.

No usar simultáneamente con corticoesteroides ni con antiinflamatorios no esteroidales (AINEs).

No usar en caso de hipersensibilidad a cimicoxib u otros AINEs.

No usar en perros que sufran trastornos gastrointestinales o trastornos hemorrágicos.

No administrar en animales con alteraciones cardíacas, hepáticas y/o renales.

No administrar en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, ya que aumenta el riesgo de toxicidad renal.

d. Efectos adversos y reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino derivados del uso del producto farmacéutico tal como es indicado, así como las medidas a tomar cuando éstos se presenten:

Se han registrado trastornos gastrointestinales leves y transitorios (vómitos y/o diarrea) muy frecuentemente. En raras ocasiones se observaron trastornos gastrointestinales graves, como hemorragia y formación de úlceras. Otras reacciones adversas como anorexia o letargo pueden observarse también en raras ocasiones.

En muy raras ocasiones se han notificado aumento de los parámetros bioquímicos renales.

Como en cualquier tratamiento a largo plazo con AINEs, la función renal debe ser monitorizada.

Si alguno de los efectos adversos persiste tras suspender el tratamiento, consulte con su médico veterinario.

Si se producen reacciones adversas como vómitos constantes, diarreas persistentes, sangre oculta en heces, pérdida repentina del peso, anorexia, letargo o empeoran los parámetros bioquímicos renales o hepáticos, se debe interrumpir el uso del medicamento y se debe iniciar monitorización y/o tratamiento adecuado.

e. Advertencias y Precauciones especiales de uso:

Se recomienda realizar análisis de laboratorio adecuados para establecer los datos basales hematológicos y séricos antes, y periódicamente durante la administración de cualquier AINE por periodos prolongados de tiempo.

Se debe aconsejar a los dueños observar a su perro en busca de signos potenciales de toxicidad al medicamento.

Otorgar periodos sin uso de medicamentos al utilizar otro AINE o corticoesteroides.

Considerar el uso de fluidos parentales durante la cirugía para disminuir las potenciales complicaciones renales del uso de AINEs prequirúrgico.

f. Uso durante preñez, lactancia, postura y animales reproductores:

No usar en animales reproductores, gestantes ni en lactancia.

g. Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto farmacológico y sus posibles efectos en el animal tratado:

Cimalgex® no debe administrarse junto con corticoesteroides u otros AINEs.

El pretratamiento con otras sustancias antiinflamatorias puede resultar en la aparición o el aumento de otros efectos adversos y, por esto, deberá observarse un periodo libre de tratamiento con tales sustancias antes del inicio del tratamiento con Cimalgex®. El periodo libre de tratamiento deberá tener en cuenta las características farmacocinéticas del medicamento veterinario usado previamente.

h. Sobredosis.

En un estudio de sobredosificación administrando a perros 3 veces (5,8 a 11,8 mg/kg de peso) y 5 veces (9,7 a 19,5 mg/kg peso) la dosis recomendada durante un periodo de 6 meses, se observó un aumento de los trastornos gastrointestinales proporcional a la dosis, que afectó a todos los perros del grupo de la dosis mas alta.

De modo similar, se registraron otros cambios relacionados con la dosis en el recuento hematológico y de glóbulos blancos, así como en la integridad renal.

Igual que con cualquier AINE, la sobredosificación puede causar toxicidad gastrointestinal, renal o hepática en perros sensibles o comprometidos.

No existe antídoto específico para este medicamento.

Se recomienda terapia sintomática y de soporte, consiste en la administración de protectores gastrointestinales e infusión salina isotónica.

i. Periodo de resguardo

No aplica.

j. Precauciones especiales para el operador (si corresponde).

Cimicoxib puede producir sensibilización cutánea. Lávese las manos después de la administración.

En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente, muéstrole el prospecto o la etiqueta.

Las personas con hipersensibilidad conocida a Cimicoxib deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

4. Particularidades farmacéuticas

a. Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado (incluidas las relacionadas con los alimentos usados como vehículos). No se han descrito.

b. Período de eficacia (estabilidad), incluyendo información luego de la primera apertura del envase y/o extracción de la primera dosis, según corresponda. 36 meses. En caso de fraccionar el comprimido, la mitad sobrante debe ser desechada tras 2 días de conservación en el blíster.

- c. **Condiciones de almacenamiento:** Mantener a temperatura ambiente, entre 15° y 30°C, en ambiente fresco y en su envase original. Cualquier mitad de comprimido deberá conservarse en el blíster durante máximo dos días.

Descripción de los envases: Caja tipo estuche de cartón impreso conteniendo 1, 2 o 4 blíster de aluminio impreso de 8 comprimidos cada uno, incluye inserto.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho, si la hubiere. Eliminar envases vacíos junto con los desechos domésticos. Producto vencido o restos del mismo, en lo posible, contactar a la empresa importadora por indicaciones para una correcta eliminación.

5. Propiedades Farmacológicas:

Cimicoxib es un antiinflamatorio no esterooidal (AINE) que pertenece al grupo de los coxib y actúa por inhibición selectiva de la enzima ciclooxigenasa 2. La enzima ciclooxigenasa (COX) está presente en dos isoformas. COX-1 es generalmente una enzima constitutiva expresada en tejidos, la cual sintetiza productos responsables de las funciones fisiológicas normales (por ejemplo, en el tracto gastrointestinal y en los riñones). Por otro lado, COX-2 es principalmente inducida y sintetizada por macrófagos y células inflamatorias tras una estimulación por citoquinas y otros mediadores de la inflamación. COX-2 está implicada en la producción de mediadores, como la PGE2 que induce dolor, sudoración, inflamación y fiebre. En un modelo in vivo de inflamación aguda, se demostró que el efecto simulado de cimicoxib dura aproximadamente 10-14 horas.

6. Propiedades Farmacocinéticas

Absorción: tras la administración oral a perros en la dosis recomendada de 2 mg/kg sin alimento, Cimicoxib se absorbe rápidamente.

Distribución: sin alimento se alcanza la máxima concentración (Tmax) en 2,25 ($\pm 1,24$) horas. El pick de concentración (Cmax) es 0,3918 ($\pm 0,09021$) $\mu\text{g/mL}$, el área bajo la curva (AUC) es 1,676 ($\pm 0,4735$) $\mu\text{g}\cdot\text{hr/mL}$, y la biodisponibilidad oral es de 44,53% ($\pm 10,26$).

La administración oral de cimicoxib con alimento, no influye significativamente sobre la biodisponibilidad, pero disminuye de forma significativa la Tmax observada.

Metabolización: el metabolismo de cimicoxib es amplio. El metabolito mayoritario, cimicoxib desmetilado, se elimina principalmente en heces por la vía biliar, y en menor medida en orina. El otro metabolito, el glucurónido conjugado del cimicoxib desmetilado, se elimina en la orina. Las enzimas metabólicas no han sido investigadas a fondo y, en algunos individuos, se ha observado un metabolismo mas lento (hasta una exposición 4 veces superior).

Eliminación: La semivida de eliminación (T1/2) es de 1,38 ($\pm 0,24$) horas.

7. Efectos Ambientales

De acuerdo a la evaluación de riesgo ambiental realizada, el producto presenta una baja exposición al medio ambiente debido a que su aplicación está restringida a tratamientos individuales en animales de compañía. En conclusión, el producto presenta un bajo riesgo medioambiental.

8. Condición de venta: Venta bajo receta medico veterinaria.

9. Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y del establecimiento importador, nombre y país de la empresa licenciante, según corresponda:

a. Fabricante y titular de registro:

VETOQUINOL S.A., Magny Vernois F-70200 Lure, Francia.

b. Importador y Distribuidor :

CHEMIE S.A.

Suecia 172, pisos 1 y 2, Providencia, Santiago.

Bajo licencia de VETOQUINOL S.A., Magny Vernois F-70200 Lure, Francia.

10. Otra información:

USO VETERINARIO

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Registro SAG N° 2516