

# CONTRALAC® 20

Antilactogénico no hormonal

Comprimido Oral

Reg. SAG N° 1581

## COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Metergolina 2,0 mg  
Excipiente c.s.p. 220 mg

## ESPECIES DE DESTINO

Perros.

## INDICACIONES DE USO

Contralac® 20 está indicado para interrumpir la lactancia de pseudopreñez y de post-parto.

## DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

0,1 mg/Kg de peso cada 12 horas, durante 8 días.

### Tabla de dosificación

| Peso del animal | Contralac® 20                |
|-----------------|------------------------------|
| 10 Kg           | ½ comprimido cada 12 horas   |
| 20 Kg           | 1 comprimido cada 12 horas   |
| 30 Kg           | 1 ½ comprimido cada 12 horas |
| 40 Kg           | 2 comprimidos cada 12 horas  |

Los comprimidos se administran por vía oral, calculando la dosis según el peso del animal. Para algunos animales que no responden al tratamiento en los primeros (8) ocho días, puede ser necesario continuar el tratamiento por 4 a 8 días más.

## ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

## CONTRAINDICACIONES Y EFECTOS NO DESEADOS

Puede presentarse vómitos o diarrea moderados y modificaciones del comportamiento (agitación); estos efectos son raros y desaparecen al interrumpir el tratamiento.

No administrar en hembras gestantes.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente: entre 15 – 30 °C.

## PRESENTACIÓN

Estuche con 2 blisters con 8 comprimidos cada uno.

## USO VETERINARIO

Venta bajo Receta Médico Veterinaria



Antilactogénico

FT0131NAC23082019R1/V1

