

EHLIQUANTEL® FORTE

Praziquantel 175 mg, Pirantel pamoato 504 mg, Febantel 525 mg
Antiparasitarios - Comprimidos Orales



REG. SAG N° 2139

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Praziquantel	175 mg
Pirantel pamoato (equivalente a 174,8 mg de Pirantel)	504 mg
Febantel	525 mg
Excipientes c.s.p.	1 Comprimido

ESPECIES DE DESTINO

Perros con peso corporal igual o mayor a 35 kg.

INDICACIONES

Para el control y tratamiento de infestaciones causadas por tenias (*Echinococcus granulosus*, *Dipylidium caninum* y *Taenia* spp.) y nematodos (*Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* y *Trichuris vulpis*) en el perro.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

La dosis a administrar es de 5 mg de Praziquantel/kg de peso corporal; 14,4 mg de Pirantel pamoato/kg de peso corporal y 15 mg de Febantel/kg de peso corporal; equivalente a 1 comprimido de Ehliquantel® Forte/35 kg de peso corporal, como dosis única.

Vía de administración: Vía oral. Administrar directamente en la boca del animal o bien, junto con alimento.

Modo de empleo:

Los perros mayores de 6 meses y los perros adultos, deben desparasitarse cada 3 meses, y de acuerdo a la siguiente indicación:

- 1 comprimido para perros de 35 kg de peso corporal.
- 1 ½ comprimido para perros de 35,1 kg a 50 kg de peso corporal.
- 2 comprimidos para perros con > 50,1 kg de peso corporal.

En zonas con *Echinococcus granulosus*, repetir la dosis única todos los meses, mientras exista infestación positiva.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a alguno de los activos.

No administrar en animales con alteraciones hepáticas severas.

No administrar en animales severamente debilitados.

No utilizar en cachorros menores de 3 semanas de edad y con un peso menor a 1 kg de peso corporal.

No administrar en conjunto con Piperacina, ya que Pirantel pamoato tiene efecto antagónico con este fármaco, ni con Levamisol, ya que al compartir el mecanismo de acción con Pirantel pamoato, puede conducir a toxicidad.

No administrar en hembras preñadas ni durante la lactancia.

No sobredosificar.

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

En algunos casos podrían presentarse signos como vómitos, náuseas, diarrea o heces blandas, anorexia y/o decaimiento, los cuales serían de carácter leve y transitorio.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30° C, en lugar seco y protegido de luz solar.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 25 sachets con 1 comprimido cada uno.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria

USO VETERINARIO

FT0121NAC30012025R2V1

