

Fiprokill® Spray

Antiparasitario externo

Fiprokill® Spray es efectivo en el control y tratamiento de la infestación por pulgas (*Ctenocephalides felis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) en perros y gatos desde los 2 días de edad, proporcionando un rápido efecto contra la pulga adulta. La eliminación de garrapatas se inicia a las 24 o 48 horas después de la aplicación.



Ficha Técnica

Forma farmacéutica

Solución spray.

Acción terapéutica

Antiparasitario externo contra pulgas y garrapatas.

Composición

Cada 100 mL de solución contiene:

Fipronil..... 0,25 g

Excipientes c.s.p.....100 mL

Indicaciones de uso

Fiprokill® Spray es efectivo en el control y tratamiento de la infestación por pulgas (*Ctenocephalides felis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) en perros y gatos desde los 2 días de edad, proporcionando un rápido efecto knock-down contra la pulga adulta.

La eliminación de garrapatas se inicia a las 24 o 48 horas después de la aplicación.

Eficacia

Fiprokill® Spray en perros, proporciona un período de protección de hasta por 3 meses contra pulgas y de hasta por 5 semanas contra garrapatas. En gatos, el período de protección contra pulgas se extiende por 4 semanas.

Vía de administración

Administración tópica por atomización. Uso externo.

Especies de destino

Perros y gatos.

Dosis

- Dosis del principio activo:
7,5 – 15 mg/kg de peso vivo.
- Dosis del producto:
Frasco atomizador con 50 y 100 mL: Aplicar entre 6 a 12 atomizaciones de FIPROKILL® Spray por Kg de peso.
Frasco atomizador con 250 mL: Aplicar entre 2 a 4 atomizaciones de FIPROKILL® Spray por Kg de peso.
Aplicar el producto mojando la raíz de los pelos, de manera que el animal quede completamente mojado.

Modo de empleo

Aplicar sobre el pelo del animal desde una distancia de aproximadamente 10 a 20 cm. Las zonas sobre las cuales se debe aplicar el producto son el vientre y los flancos (pecho, abdomen, axilas, hombros y patas). En animales de pelo largo, apartar el pelo y aplicar el producto a contra pelo, hasta la raíz.

Friccionar el pelo para que el producto penetre la piel. Dejar secar naturalmente. No usar secador.

Para tratar la cara, verter un poco de producto en la palma de la mano enguantada y luego aplicar frotando suavemente la cara, evitando los ojos.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Administrar con precaución en animales debilitados y seniles.
 - Producto inflamable. Mantener alejado de las fuentes de calor.
-

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar entre 15 y 30 °C, protegido de la luz. Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 12 semanas. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

Contraindicaciones

- No aplicar en conejos.
 - No aplicar en animales con hipersensibilidad conocida a Fipronil.
-

Efectos adversos y reacciones adversas

- Si el animal se lamiese puede existir un breve período de hipersalivación (principalmente en gatos).
 - Podrían ocurrir reacciones cutáneas transitorias en el sitio de aplicación como eritema, prurito o alopecia.
 - En el caso de existir hipersensibilidad o irritación local se recomienda no repetir el tratamiento.
-

Precauciones para el operador

- Aplicar en ambientes ventilados.
 - Utilizar guantes al aplicar el producto.
 - No fumar, comer o beber durante la manipulación y aplicación del producto.
 - Evitar el contacto con el animal tratado hasta que su pelaje se encuentre completamente seco.
 - Evitar dormir con el animal tratado recientemente.
 - En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua.
 - En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar la etiqueta del producto.
-

Advertencias y precauciones especiales de uso

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Administrar con precaución en animales debilitados y seniles.
 - Producto inflamable. Mantener alejado de las fuentes de calor.
-

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho

Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua, ya que el producto es tóxico para aves, abejas y peces. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

Condiciones de venta

Venta libre.

Observaciones

USO VETERINARIO

USO EXTERNO

Registros

Chile: Reg. SAG N° 1872

Panamá: Reg. N° RF-4541-19

Rep. Dominicana: Reg. N° 8664

Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F N° 007256/16

Perú: Reg. SENASA F.87.30.I.0193

Uruguay: Reg. MGAP N° 2020A00783

Presentación

Frasco con válvula atomizadora con 50 mL, 100 mL y 250 mL

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N°300. Quilicura. Santiago. Chile
