

Gastroenteril®

Antimicrobiano – Antiprotozoario

Gastroenteril® suspensión oral, está indicado para el tratamiento de diarreas asociadas a giardias, en perros y gatos. También está indicado en infecciones entéricas y sistémicas causadas por bacterias anaerobias obligadas sensibles al Metronidazol.



Ficha Técnica

Forma farmacéutica

Suspensión Oral.

Acción terapéutica

Antimicrobiano – Antiprotozoario.

Composición

Cada 100 mL de producto contiene:

Metronidazol.....2,5 g

Excipientes c.s.p.....100 mL

Indicaciones de uso

Gastroenteril® suspensión oral, está indicado para el tratamiento de diarreas asociadas a giardias, en perros y gatos. También está indicado en infecciones entéricas y sistémicas causadas por bacterias anaerobias obligadas sensibles al Metronidazol.

Especies de destino

Perros y gatos.

Vía de administración

Oral.

Dosis

- En el caso de infecciones anaeróbicas sistémicas, la terapia se puede prolongar por 6 semanas.

PERROS Y GATOS	Dosis del principio activo	Dosis del producto
Giardiasis e infecciones por anaerobios:	25 mg de Metronidazol/Kg, cada 12 horas por 5-7 días*.	1 mL/Kg de peso, dos veces al día por 5 a 7 días*

Advertencias y precauciones especiales de uso

- Gastroenteril® suspensión oral debe usarse con precaución en animales con disfunción hepática. En caso de deterioro hepático significativo, utilizar el 25-50% de la dosis usual.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Efectos adversos y reacciones adversas

Vómitos, hepatotoxicidad, neutropenia. En tratamientos prolongados, signos neurológicos, los cuales remiten totalmente una vez discontinuado el uso del producto.

Contraindicaciones

- No administrar a pacientes con hipersensibilidad al Metronidazol o derivados nitroimidazólicos.
 - No utilizar durante la gestación, lactancia o en animales reproductores.
-

Interacciones

- Metronidazol puede prolongar el tiempo de protrombina en pacientes medicados con Warfarina u otros anticoagulantes cumarínicos.
 - El Fenobarbital o Fenitoína pueden incrementar el metabolismo del Metronidazol e incrementar la probabilidad de efectos colaterales relacionados con la dosis.
-

Precauciones especiales para el operador

- Lavar las manos después de su uso.
 - No manipular por personas hipersensibles al Metronidazol.
 - En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua.
 - No manipular por mujeres embarazadas.
 - En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar la etiqueta del producto.
 - No comer, fumar ni beber durante su administración.
-

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con resto de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar a temperatura entre 2 y 30°C, protegido de la luz.

Una vez abierto, utilizar el producto dentro de 3 meses. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

Condiciones de venta

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

Observaciones

USO VETERINARIO

AGITAR ANTES DE USAR

Registros

Chile: Reg. SAG N° 2036

Costa Rica: Reg. N° MV-5785

Uruguay: Reg. MGAP N° 2016A00378

Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F-N° 006142/14

Perú: Registro SENASA F.91.02.I.0005

El Salvador: VE2023066048

Presentación

Frasco con 120 mL

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.