

Hasyun® Comprimidos

Antiinflamatorio y Antialérgico

Tratamiento en desórdenes de hipersensibilidad como estados de shock; terapia de enfermedades inmunes como por ejemplo pénfigo; casos graves de dermatitis y lupus eritematoso sistémico; desórdenes musculo-esqueléticos; alergias e hipoadrenocorticismo.



Ficha Técnica

Forma farmacéutica

Comprimidos.

Acción terapéutica

Antiinflamatorio y Antialérgico.

Composición

Cada comprimido contiene:

Dexametasona.....0,25 mg

Excipientes c.s.p.....1 comprimido

Indicaciones de uso

Tratamiento en desórdenes de hipersensibilidad como estados de shock; terapia de enfermedades inmunes como por ejemplo pénfigo; casos graves de dermatitis y lupus eritematoso sistémico; desórdenes musculo esqueléticos; alergias e hipoadrenocorticismo.

Especies de destino

Perros y gatos.

Vía de administración

Oral.

Dosis

Antinflamatorio – Antialérgico:

- Perros: 1 a 4 comprimidos (0,25 a 1 mg) al día, por 7 días
- Gatos: ½ a 2 comprimidos (0,125 a 0,5 mg) al día, por 7 días.

Contraindicaciones

- No usar en hembras gestantes.
- No usar en pacientes con úlcera gástrica y duodenal.
- No usar en pacientes con úlcera corneal.
- No usar en pacientes con Diabetes Mellitus o con Síndrome de Cushing.

Efectos adversos y reacciones adversas

Puede causar polifagia, poliuria y polidipsia, retrasar la cicatrización de heridas, debilitar la resistencia a infecciones o agravar las ya existentes. En tratamientos prolongados puede causar hiperadrenocorticismio iatrogénico (Síndrome de Cushing), con pérdida de masa muscular, debilidad, ganancia de peso con redistribución grasa, osteoporosis y úlceras.

Interacciones

- La administración concomitante con Anfotericina B o diuréticos caluréticos (Furosemida, tiacidas) pueden causar hipokalemia.
 - Cuando ambas drogas se emplean conjuntamente con glucósidos digitálicos, puede aumentar la posibilidad de toxicidad si se genera hipokalemia.
 - Dexametasona puede reducir los niveles sanguíneos de salicilatos.
 - Los requerimientos insulínicos pueden incrementar en pacientes que reciben Dexametasona.
 - La Fenitoína, Fenobarbital y Rifampicina pueden aumentar el metabolismo de glucocorticoides.
 - La administración concomitante con Ciclosporina puede incrementar los niveles sanguíneos de ambas drogas, con inhibición mutua del metabolismo hepático.
 - La administración concomitante con drogas ulcerogénicas (por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos) puede incrementar el riesgo de ulceración gastrointestinal.
 - Los pacientes tratados con corticoesteroides en dosis inmunosupresoras no deberían recibir vacunas a virus vivos atenuados, pueden potenciar la replicación viral.
-

Precauciones especiales para el operador

Lavarse las manos después de administrar el producto.

Advertencias y precauciones especiales de uso

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - En caso de terapia prolongada (más de 7 días) se debe suspender gradualmente en días sucesivos acorde a lo indicado por el Médico Veterinario tratante.
-

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho

No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

Condiciones de almacenamiento

Mantener en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C.

Condiciones de venta

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

Observaciones

USO VETERINARIO

Registros

Chile: Reg. SAG N° 527

Uruguay: Reg. MGAP N° A-4494

Perú: Reg. SENASA F.06.21.I.0242

Bolivia: Reg. SENASAG PUV-n° 009804/21

Presentación

Estuche con 10 comprimidos.

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.
