

Inveclor® Jabón Líquido

Jabón antiséptico de piel y mucosas

Inveclor®, combina las ventajas de limpiadores jabonosos con un antiséptico eficaz, de amplio espectro y seguro como la Clorhexidina, por lo que es ideal para tratar áreas de piel y/o mucosas en donde se requiera disminuir la contaminación en forma rápida y persistente.



Ficha Técnica

Forma farmacéutica

Jabón líquido.

Acción terapéutica

Jabón antiséptico de piel y mucosas.

Composición

Cada 100 mL de jabón contiene:

Clorhexidina Gluconato.....2 g

Excipientes c.s.p.....100 mL

Propiedades

El producto Inveclor®, combina las ventajas de limpiadores jabonosos con un antiséptico eficaz, de amplio espectro y seguro como la Clorhexidina, por lo que es ideal para tratar áreas de piel y/o mucosas en donde se requiera disminuir la contaminación en forma rápida y persistente.

La Clorhexidina presenta un amplio espectro de actividad antimicrobiana. Es muy efectiva contra bacterias Gram positivas, especialmente contra Staphylococcus aureus, otros estafilococos y varias especies de estreptococos. Es menos efectiva contra Gram negativas como Escherichia coli, Klebsiella, Salmonella y Pseudomonas. Es capaz de impedir la germinación de esporas bacterianas. Es medianamente activa contra M. tuberculosis. Es activa frente a hongos como Candida albicans, Microsporum gypseum, M. canis y Trichophyton mentagrophytes y levaduras. Presenta actividad variable contra virus.

Especies de destino

Caballos.

Indicaciones

Inveclor®, Clorhexidina Gluconato 2%, jabón líquido, está indicado como jabón antiséptico de piel y mucosas.

Vía de administración

Uso tópico.

Dosis del producto

Disponer abundante cantidad de Inveclor®, Clorhexidina Gluconato 2%, jabón líquido, en la zona de piel y/o mucosa a tratar de manera que ésta quede totalmente cubierta por el producto.

Contraindicaciones

- No usar en animales que presentan hipersensibilidad a la Clorhexidina Gluconato.
 - Contraindicado en casos de animales con heridas, ya que su uso retrasa el proceso de cicatrización.
-

Modo de empleo

Previo a la aplicación de este producto, remover la suciedad y contaminación de la zona a tratar. Luego, humedecer el área y aplicar el producto directamente sobre la piel y/o mucosas en cantidad suficiente para que la zona quede totalmente cubierta. Restregar (con cepillo, escobilla, esponja o manualmente) el área suavemente durante 5 minutos. Enjuagar con abundante agua para retirar la totalidad del producto y secar con una toalla, gasa o compresa estéril.

Advertencias y precauciones especiales de uso

- Se debe dejar actuar el producto aplicado durante 5 minutos antes de enjuagar.
 - Para mejorar las condiciones de antisepsia, se recomienda depilar el área tratada antes del uso de este producto.
 - No utilizar en ojos, oídos, ni interior de la boca del animal; en caso de contacto lavar con abundante agua.
 - Mantener fuera del alcance de los niños.
-

Precauciones especiales para el operador

- No debe ser manipulado por personas hipersensibles a Clorhexidina.
 - Lavarse las manos después de su uso. Se recomienda el uso de guantes.
 - En caso de contacto con la piel o con los ojos se recomienda lavar con abundante agua. Si se desarrolla irritación y esta persiste, consultar al médico.
-

Uso durante la preñez y lactancia

Indicado para su uso seguro en hembras preñadas o en lactancia.

Interacción con otros productos farmacéuticos

No mezclar con otros desinfectantes y antisépticos.

Período de resguardo

0 días.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar seco a temperatura entre 2 y 30 °C, protegido de la luz.

Condición de venta

Venta libre.

Observaciones

USO VETERINARIO

USO EXTERNO

Registros

Reg. SAG N° 2242

Prsentación

Envase con 1L

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.