

Inveclor® Spray

Antiséptico de rápida acción germicida con efecto residual

Por su acción bactericida y fungicida de amplio espectro, Inveclor® Spray se indica como antiséptico y para el aseo pre-quirúrgico de la piel del animal. Puede ser utilizado como antiséptico de la piel previo la introducción de catéteres endovenosos, o en cualquier procedimiento quirúrgico menor que requiera una antisepsia profunda de la piel intacta. Su uso se indica como alternativa al uso de antisépticos yodados.



Ficha Técnica

Forma farmacéutica

Solución tópica.

Acción terapéutica

Antiséptico.

Composición

Cada 100 mL de solución tópica contiene:

Clorhexidina Gluconato 20%.....2,5 g

(Equivalente a 0,5 g de Clorhexidina Gluconato)

Excipientes c.s.p.....100 mL

Indicaciones de uso

Por su acción bactericida y fungicida de amplio espectro, Inveclor® Spray se indica como antiséptico y para el aseo pre-quirúrgico de la piel del animal. Puede ser utilizado como antiséptico de la piel previo la introducción de catéteres endovenosos, o en cualquier procedimiento quirúrgico menor que requiera una antisepsia profunda de la piel intacta. Su uso se indica como alternativa al uso de antisépticos yodados.

Especies de destino

Perros, gatos, caballos, bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, aves y animales exóticos.

Dosis y modo de empleo

Uso pre-quirúrgico: Luego de depilar la zona a intervenir, se recomienda rociar abundantemente con Inveclor® Spray, frotar con algodón o gasa y dejar secar sin enjuagar.

Vía de administración

Tópica.

Advertencias y precauciones especiales de uso

- Sólo para uso externo.
- Aplicar directamente sin diluir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Contraindicaciones

- No administrar en animales con hipersensibilidad al principio activo.
 - No utilizar en presencia de detergentes aniónicos.
-

Efectos adversos y reacciones adversas

La Clorhexidina tiene bajo potencial de toxicidad dérmica o sistémica. Muy raramente podrían existir reacciones dérmicas.

Interacciones

La actividad de Clorhexidina puede ser reducida por jabones naturales, varios aniones inorgánicos, surfactantes no iónicos y cremas que contengan agentes emulgentes aniónicos.

Precauciones especiales para el operador

Evitar el contacto con los ojos, oídos y boca; el producto puede causar lesiones permanentes por la irritación de estas áreas. Si hubiere contacto se recomienda enjuagar inmediatamente con abundante agua fría.

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar entre 15 y 30 °C, protegido de la luz.

Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 12 semanas. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

Condición de venta

Venta Libre.

Observaciones

USO EXTERNO

USO VETERINARIO

Registros

Reg. SAG N° 1852

Presentación

Frasco con 250 mL

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
Lautaro N° 300 • Quilicura • Santiago • Chile
