

Invermic® Perros

Antiparasitario interno

Antihelmíntico contra formas larvarias y adultas de nematodos tales como: Toxascaris leonina, Toxocara canis, Ancylostoma caninum y Uncinaria stenocephala. Acción inmunoestimulante, pudiendo utilizarse en animales debilitados o inmunodeprimidos.

Ficha Técnica

Forma farmacéutica

Solución Oral.



Acción terapéutica

Antiparasitario interno.

Composición

Cada 100 mL de solución oral contiene:

Levamisol Clorhidrato.....2,360 g

(Equivalentes a 2,0 g de Levamisol)

Excipientes c.s.p.....100 mL

Indicaciones de uso

Antihelmíntico contra formas larvarias y adultas de nematodos tales como: Toxascaris leonina, Toxocara canis, Ancylostoma caninum y Uncinaria stenocephala. Acción inmunoestimulante, pudiendo utilizarse en animales debilitados o inmunodeprimidos.

Especies de destino

Perros.

Vía de administración y modo de empleo

Administrar directamente en la cavidad oral.

Dosis

- Antiparasitario: Administrar 6 gotas/Kg de peso (6 mg/kg). Dosis única.
- Inmunomodulador: Administrar 2 a 3 gotas/Kg de peso (2 a 3 mg/Kg). Utilizar 3 veces por semana. La duración del tratamiento depende de la patología inmune a tratar.

Contraindicaciones

- No administrar en animales con hipersensibilidad al principio activo.
- No administrar a perras en el último tercio de gestación ni durante el período de lactancia.
- No administrar a perros que presenten insuficiencia hepática o renal.
- No administrar a perros menores de 2 semanas de edad.

Interacciones

- Emplear con precaución al administrar en conjunto con otros compuestos nicotínicos o drogas inhibidoras de colinesterasa, pues pueden acrecentar los efectos tóxicos del Levamisol.
 - No utilizar en forma concomitante con Cloranfenicol.
-

Efectos adversos y reacciones adversas

No se han descrito.

Advertencias

Mantener fuera del alcance de los niños.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar entre 2° y 30°C, protegido de la luz. Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 12 semanas. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

Condiciones de venta

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

Observaciones

USO VETERINARIO

Registros

Reg. SAG N° 368

Presentación

Frasco gotario con 10 mL

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.
