

Mebermic®

Antiparasitario de amplio espectro en dosis única

Tratamiento de parasitosis internas causada por nematodos y cestodos, tales como, *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma caninum* (no existente en Chile), *Uncinaria stenocephala*, *Taenia pisiformis*, *Taenia taeniaformis*. *Taenia hydatigena*, *Taenia serialis*, *Echinococcus granulosus* y *Dipylidium caninum*.



Ficha Técnica

Forma farmacéutica

Comprimido oral.

Acción terapéutica

Antiparasitario de amplio espectro en dosis única.

Composición

Cada comprimido contiene:

Praziquantel.....50 mg

Mebendazol.....220 mg

Excipientes c.s.p.....1 comp.

Indicaciones de uso

Tratamiento de parasitosis internas causada por nematodos y cestodos, tales como, *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma caninum* (no existente en Chile), *Uncinaria stenocephala*, *Taenia pisiformis*, *Taenia taeniaformis*. *Taenia hydatigena*, *Taenia serialis*, *Echinococcus granulosus* y *Dipylidium caninum*.

Especies de destino

Perros y gatos.

Vía de administración

Vía oral.

Dosis

1 comp/10 Kg de peso, en dosis única (equivalente a 5 mg de Praziquantel y 22 mg de Mebendazol por Kg de peso).

Contraindicaciones

- No administrar en perros menores de 4 semanas de edad, ni en gatos menores de 6 semanas de edad.
- No usar en animales con alteraciones de la función hepática, renal o cardíaca.
- No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

Advertencias, interacciones, efectos adversos y reacciones adversas

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.
- En algunos animales se pueden presentar en forma transitoria sialorrea, náuseas, vómitos, depresión, heces blandas o diarrea.

Precauciones especiales para el operador

- Lavarse las manos después de administrar el producto.
- No fumar, comer o beber durante la manipulación y administración del producto.
- En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar envase del producto.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho

Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

Observaciones

USO VETERINARIO

Condiciones de almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente a menos de 25 °C. No refrigerar ni congelar.
Para Perú: Almacenar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C.

Condición de venta

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

Registros

Chile: Reg. SAG. N° 451
Perú: Reg. SENASA F.08.21.I.1125
Importado y distribuido por Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Presentación

Estuche con 50 sobres de 1 comprimido.

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.
