

Meloxivet® Gato

Analgésico y Antiinflamatorio

MELOXIVET® GATO Meloxicam 0,5 mg/mL, Solución oral. Indicado para el control del dolor y la inflamación asociada a trastornos locomotores dolorosos agudos y cuadros de osteoartritis en gatos.



Ficha Técnica

Forma farmacéutica

Solución oral.

Acción terapéutica

Analgésico y antiinflamatorio.

Composición

Cada mL de solución oral contiene:

Meloxicam. 0,5 mg

Excipientes c.s.p... 1 mL

Indicaciones de uso

Indicado para el control del dolor y la inflamación asociada a trastornos locomotores dolorosos agudos y cuadros de osteoartritis en gatos.

Especie de destino

Gatos.

Vía de administración

Oral.

Dosis

Administrar una dosis inicial de 0,2 mL por cada kilo de peso el primer día de tratamiento, seguido por una dosis de mantención de 0,1 mL por cada kilo de peso cada 24 horas. Estas dosis equivalen a administrar una dosis inicial del principio activo de 0,1 mg/Kg de peso el primer día de tratamiento, seguido por una dosis de mantención de 0,05 mg/Kg de peso cada 24 horas. La duración del tratamiento agudo es de 5 días, pudiéndose prolongar por hasta 14 días en cuadros de osteoartritis felina. La respuesta a la terapia a largo plazo debe ser controlada a intervalos regulares por un Médico Veterinario.

Modo de empleo

La solución se debe administrar utilizando la jeringa dosificadora incluida en el envase, según el peso de cada animal. Administrar mezclada con una porción de alimento o directamente en la boca del gato. Lavar y secar la jeringa dosificadora entre las diferentes administraciones.

Advertencias y precauciones especiales de uso

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Se debe tener especial cuidado con respecto a la precisión de la dosificación en gatos. No exceder la dosis indicada.
 - Evitar su uso en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, ya que existe un mayor riesgo potencial de desarrollar toxicidad renal.
 - Se debe evitar la administración simultánea de medicamentos con potencial nefrotóxico.
 - Meloxicam, como todos los antiinflamatorios no esteroideos (AINES), debe usarse con precaución en animales con insuficiencia hepática, cardíaca o renal y animales con trastornos hemorrágicos. La hipotensión, dosis altas, hipovolemia, depleción de sodio y la anestesia por inhalación parecen aumentar el riesgo de toxicidad renal por AINES.
 - Los animales con problemas gastrointestinales preexistentes pueden tener un mayor riesgo de efectos adversos de los AINES.
 - El tratamiento debe ser suspendido en el caso de no observarse la respuesta clínica esperada.
-

Contraindicaciones

- No administrar en gatos con hipersensibilidad conocida al Meloxicam u otros antiinflamatorios no esteroideos (AINES).
 - No administrar a gatos menores a 4 meses de edad y que pesen menos de 450 gramos, ya que la seguridad no ha sido evaluada en ellos.
 - No usar en gatos que presenten trastornos gastrointestinales como irritación y hemorragia, disfunción hepática, cardíaca o renal y trastornos hemorrágicos.
 - No administrar en hembras preñadas, en lactancia o en animales reproductores.
 - No administrar en conjunto con otros AINES o glucocorticoides
-

Efectos no deseados y reacciones adversas

Los principales efectos adversos son efectos gastrointestinales, tales como vómitos, diarrea, ulceración gastrointestinal, inapetencia, además de cambios de comportamiento y letargo, los cuales se presentan en aproximadamente 10% de los casos. Estos efectos son en la mayoría de los casos transitorios y desaparecen después de terminar el tratamiento. Si existen efectos adversos, discontinuar el tratamiento y acudir a un Médico Veterinario.

Interacciones

- La administración en conjunto con Amiodarona, Digoxina, Fluconazol o Sulfonamidas podrían aumentar las concentraciones de Meloxicam.
 - Algunos AINES pueden reducir los efectos sobre la presión sanguínea de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAs) o del Amlodipino.
 - La administración en conjunto con anticoagulantes (ej. Heparina o Warfarina), antidepresivos tricíclicos (ej., Amitriptilina, Clomipramina), Clopidogrel, inhibidores selectivos de la recaptación de Serotonina (ej., Fluoxetina) o Pentoxifilina, podrían aumentar el riesgo de sangramiento o hemorragia de Meloxicam.
 - La administración en conjunto con Ciclosporina (sistémica), diuréticos (ej. Furosemida o Hidroclorotiazida), medicamentos nefrotóxicos (ej. Furosemida, Anfotericina B y aminoglicósidos) o anestésicos inhalatorios (ej. Isoflurano o Sevoflurano), podrían aumentar el riesgo de nefrotoxicidad de Meloxicam.
 - La administración en conjunto con otros AINES, corticoides (ej. Dexametasona, Prednisolona), bifosfonatos (ej. Alendronato) y salicilatos (ej., Subsalicilato de bismuto), puede exacerbar los efectos adversos gastrointestinales de Meloxicam.
 - Meloxicam puede aumentar las concentraciones de fluoroquinolonas (ej. Enrofloxacino, Marbofloxacino), aumentando el riesgo de toxicidad del sistema nervioso central (SNC).
 - La administración en conjunto con Leflunomida puede aumentar el riesgo de hepatotoxicidad.
 - El uso concomitante de AINES con Metotrexato, puede aumentar el riesgo de mielosupresión, nefropatía, hepatotoxicidad y toxicidad gastrointestinal; utilícelos junto con extrema precaución.
-

Precauciones especiales para el operador

- No manipular por personas hipersensibles a Meloxicam u otros AINES.
- No fumar, comer ni beber durante la administración del producto.
- En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua. En caso de irritación, acudir a un centro médico y mostrar inserto del producto.

- En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar el inserto del producto.

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente a menos de 25 °C. No refrigerar ni congelar. Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 28 días. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

Condición de venta

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

Observaciones

USO VETERINARIO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

Registros

Chile: Reg. SAG N° 2690
Perú: Reg. SENASA F.99.32.I.0130

Presentación

Frasco con 20 mL

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.
