

## Meloxivet® Perros

Analgésico y Antiinflamatorio

MELOXIVET® Meloxicam 1 mg/mL, Solución oral, está indicado para el control del dolor y la inflamación asociada a cuadros de osteoartritis en perros.

## Ficha Técnica

### Forma farmacéutica

Solución oral.



### Acción terapéutica

Analgésico y antiinflamatorio.

### Composición

Cada mL de solución oral contiene:

Meloxicam. .... 1 mg

Excipientes c.s.p... 1 mL

### Indicaciones de uso

Meloxivet®, Meloxicam 1 mg/mL, Solución oral, está indicado para el control del dolor y la inflamación asociada a cuadros de osteoartritis en perros.

### Especie de destino

Perros.

### Vía de administración

Oral.

### Dosis

Administrar una dosis inicial de 0,2 mL por cada kilo de peso el primer día de tratamiento, seguido por una dosis de mantención de 0,1 mL por cada kilo de peso cada 24 horas. Estas dosis equivalen a administrar una dosis inicial del principio activo de 0,2 mg/Kg de peso el primer día de tratamiento, seguido por una dosis de mantención de 0,1 mg/Kg de peso cada 24 horas.

La duración del tratamiento dependerá del cuadro a tratar. Para el dolor agudo, la duración del tratamiento puede prolongarse por hasta 15 días dependiendo del grado de dolor e inflamación. Para el dolor crónico, la duración del tratamiento se puede prolongar por 21 a 28 días. El tratamiento tanto agudo como crónico, debe ser suspendido al cabo de 10 días si no hay mejoría aparente o si se presentan vómitos o sangre oculta en las heces.

### Modo de empleo

La solución se debe administrar utilizando la jeringa dosificadora incluida en el envase, según el peso de cada animal. Administrar mezclada con una porción de alimento o directamente en el hocico del perro.

## Advertencias y precauciones especiales de uso

- Se debe tener especial cuidado en animales deshidratados, hipovolémicos e hipotensos ya que existe un mayor riesgo potencial de desarrollar toxicidad renal.
  - El tratamiento debe ser suspendido en el caso de no observarse la respuesta clínica esperada.
  - Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- 

## Contraindicaciones

- Meloxicam está contraindicado en perros con hipersensibilidad conocida al Meloxicam, Piroxicam u otros AINEs.
  - No administrar a perros menores a 6 meses o que pesen menos de 6 kilos.
  - Meloxicam no debería ser usado en perros con ulceración o sangrado gastrointestinal activo.
  - No usar en pacientes con insuficiencia hepática, cardíaca o renal y trastornos hemorrágicos.
  - No administrar en hembras preñadas o en lactancia o en animales reproductores.
- 

## Efectos no deseados y reacciones adversas

- Los efectos adversos reportados en perros tratados con Meloxicam son similares a los observados con otros AINEs e incluyen efectos gastrointestinales (vómitos, inapetencia, heces blandas, diarrea, melena, ulceraciones gastrointestinales, hematemesis), hepáticos (enzimas hepáticas elevadas, ictericia), dermatológicos (prurito, urticaria, dermatitis), renales (azotemia, elevación de creatinina y urea sanguínea, insuficiencia renal), del sistema nervioso central y comportamiento (ataxia, alteraciones de la personalidad, convulsiones, somnolencia, hiperactividad, depresión, temores y letargia en cachorros) y hematológicos (alteración en los tiempos de coagulación, anemia hemolítica inmunomediada, trombocitopenia inmunomediada).
  - Los efectos no deseados generalmente ocurren después de los 7 días de tratamiento y en la mayoría de los casos son de carácter transitorio y desaparecen una vez finalizado el tratamiento. En el caso de observar efectos no deseados y/o reacciones adversas el tratamiento debe ser suspendido.
- 

## Interacciones

- Los AINEs podrían reducir los efectos de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ej. Enalapril, Benazepril), sobre la presión sanguínea.
  - Meloxicam interactúa con anticoagulantes como Heparina o Warfarina y podría incrementar la posibilidad de sangramiento.
  - Su administración con corticoides u otros AINEs, podría incrementar el riesgo de toxicidad gastrointestinal (ulceración, sangramiento, vómitos o diarrea).
  - Los AINEs podrían reducir los efectos diuréticos de la Furosemida.
  - Los AINEs podrían incrementar el riesgo de nefrotoxicidad, cuando es usado en conjunto con drogas nefrotóxicas o diuréticos, como Furosemida y aminoglicósidos.
- 

## Precauciones especiales para el operador

- No manipular por personas hipersensibles a Meloxicam u otros antiinflamatorios no esteroideos (AINEs).
  - En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua. En caso de irritación, acudir a un centro médico y mostrar el folleto del producto. En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar el folleto del producto.
- 

## Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

---

## Condiciones de almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente a menos de 25 °C. No congelar. Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 30 días.  
Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.  
Para Perú: Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C, protegido de la luz.

---

## Condición de venta

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

---

## Observaciones

USO VETERINARIO  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

---

## Registros

Chile: Reg. SAG N° 2415  
Perú: Reg. SENASA F.99.32.I.0130

---

## Presentación

Frasco con 60 mL

---

## Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.  
Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.

---