

Regepipel® Plus

Shampoo antiséptico y antimicótico

Para el tratamiento de la dermatitis seborreica asociada con infecciones por *Staphylococcus intermedius*, *Malassezia pachydermatis*, y como ayuda en el tratamiento de infecciones dermatófitas debidas a *Microsporum canis* en perros y gatos.



Ficha Técnica

Forma farmacéutica

Shampoo.

Acción terapéutica

Shampoo antiséptico y antimicótico.

Composición

Cada 100 mL contiene:

Clorhexidina Gluconato 20%.....10 g
(Equivalente a 2 g de Clorhexidina Gluconato)
Miconazol Nitrato..... 2,3 g
(Equivalente a 2 g de Miconazol base)
Excipientes c.s.p..... 100 mL

Indicaciones de uso

Para el tratamiento de la dermatitis seborreica asociada con infecciones por *Staphylococcus intermedius*, *Malassezia pachydermatis*, y como ayuda en el tratamiento de infecciones dermatófitas debidas a *Microsporum canis* en perros y gatos.

Modo de empleo

- Moje al animal con abundante agua.
- Aplicar una cantidad suficiente del shampoo en varios puntos y masajear. Con la ayuda de una esponja esparcir para favorecer su penetración en la piel y el pelaje. Asegúrese de aplicar Regepipel® Plus alrededor de los labios, bajo la cola y entre los dedos por ser aquellas áreas reservorios de agentes causales.
- Dejar actuar por 10 a 15 minutos, luego enjuagar con abundante agua limpia.
- Repetir dos o tres veces por semana hasta que los síntomas disminuyan y luego una vez por semana o según indicación del Médico Veterinario.

Especies de destino

Perros y gatos.

Advertencias y precauciones especiales de uso

- En el tratamiento de dermatofitosis, la asociación de la terapia tópica a la terapia sistémica favorece la cura de las lesiones en 6-9 semanas, tiempo menor al requerido cuando se administra sólo la terapia sistémica.
- En caso de irritación local, suspender el tratamiento.
- Evitar el contacto con los ojos del animal, en caso de contacto accidental lavar inmediatamente con abundante agua.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Contraindicaciones

- No usar en gatos menores a 6 semanas de edad y en perros menores a 4 semanas de edad.
- No administrar en los individuos que presenten hipersensibilidad conocida a algún componente de la preparación.
- No usar en hembras en periodo de gestación o lactancia.

Interacciones

La Clorhexidina se inactiva al ser usada con detergentes comunes o compuestos aniónicos.

Precauciones especiales para el operador

Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto accidental lavar inmediatamente con abundante agua.

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

Observaciones

USO EXTERNO

USO VETERINARIO

Condiciones de almacenamiento

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30°C.

Condiciones de venta

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

Registros

Chile: Reg. SAG N° 1696

Panamá: Reg. N° RF-8355-18

El Salvador: VE2013084783

Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F N° 007259/16

Uruguay: Reg. MGAP N° 2019A00682

Presentación

Envase con 150 mL

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.
