

Respig®

Antimicrobiano de amplio espectro

Antimicrobiano de amplio espectro indicado para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto urinario e infecciones de tejidos blandos, causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas susceptibles al Sulfametoxazol y Trimetoprima.

Ficha Técnica

Forma Farmacéutica

Suspensión oral.



Acción Terapéutica

Antimicrobiano de amplio espectro.

Composición

Cada 5 mL de suspensión oral contiene:

Sulfametoxazol.....200 mg
Trimetoprima.....40 mg
Excipientes c.s.p.....5 mL

Indicaciones de uso

Antimicrobiano de amplio espectro indicado para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto urinario e infecciones de tejidos blandos, causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas susceptibles al Sulfametoxazol y Trimetoprima.

Vía de administración

Vía oral.

Dosis

- Dosis de los principios activos:
30 mg de la asociación por kilo de peso cada 24 horas, o 15 mg de la asociación por kilo de peso cada 12 horas, por 7 a 10 días.
- Dosis del producto:
5 mL por cada 8 Kg de peso, cada 24 horas; o bien 2,5 mL cada 8 Kg de peso, cada 12 horas, por 7 a 10 días.
No administrar por más de 14 días.

Modo de empleo

Agitar antes de usar. Administrar mediante jeringa dosificadora.

Especies de destino

Perros y gatos.

Contraindicaciones

- No usar en perros con daño hepático y/o renal.
 - No administrar a animales hipersensibles a las sulfonamidas.
 - No usar en perros de raza Pinscher.
 - No administrar en hembras preñadas o en lactancia.
-

Interacciones

- La asociación de Sulfametoxazol y Trimetoprima puede prolongar los tiempos de coagulación en pacientes medicados con anticoagulantes cumarínicos.
 - Los antiácidos pueden disminuir la biodisponibilidad de las sulfonamidas si se administran en forma concurrente.
 - La Trimetoprima puede reducir los efectos terapéuticos de la Ciclosporina (sistémica) y aumentar el riesgo de nefrotoxicidad.
-

Efectos adversos y reacciones adversas

Terapias prolongadas con sulfonamidas potenciadas pueden inducir hipotiroidismo en perros. Pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad agudas tipo I (anafilaxis) o III. Estas parecen ser más frecuentes en razas caninas grandes, siendo el Doberman Pinscher más susceptible que otras razas. También puede generar cuadros de queratitis Sicca en perros.

Advertencias

Mantener fuera del alcance de los niños.

Precauciones especiales para el operador

No manipular por personas hipersensibles a sulfonamidas.

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar entre 15 y 30 °C, protegido de la luz. Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 14 días. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

Condición de venta

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

Registros

Chile: Reg. SAG N° 944

Observaciones

USO VETERINARIO

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.
