

Rostrum® Suspensión Oral

Antibacteriano de amplio espectro

Rostrum® es un antibacteriano de amplio espectro, recomendado para el tratamiento de infecciones del tracto gastrointestinal, tracto respiratorio, infecciones genitourinarias como nefritis, pielonefritis o cistitis, infecciones cutáneas, infecciones del conducto auditivo externo, otitis, dermatitis y heridas infectadas.

Ficha Técnica

Forma farmacéutica

Suspensión oral.



Acción terapéutica

Antibacteriano de amplio espectro.

Composición

Cada mL de suspensión oral contiene:

Enrofloxacin..... 25 mg

Excipientes c.s.p. 1 mL

Propiedades

El Enrofloxacin es un agente antimicrobiano sintético perteneciente a la familia de las Fluoroquinolonas, que se caracterizan por ser antibióticos bactericidas que presentan una potente actividad antibacteriana frente a una gran variedad de microorganismos principalmente frente a bacterias Gram negativas, Gram positivas, Micoplasmas y Clamidas.

Indicaciones

Rostrum®, es un antibacteriano de amplio espectro, recomendado para el tratamiento de:

- Infecciones del tracto gastrointestinal (*Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Proteus* spp.).
- Infecciones del tracto respiratorio (*Pasteurella* spp., *Bordetella* spp., *Klebsiella* spp.).
- Infecciones genitourinarias como nefritis, pielonefritis, cistitis (*Escherichia coli*, *Corynebacterium pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp. y *Pseudomonas aeruginosa*).
- Infecciones cutáneas.
- Infecciones del conducto auditivo externo y otitis (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp. y *Pseudomonas aeruginosa*).
- Dermatitis, heridas infectadas (*Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp. y *Pseudomonas aeruginosa*).

Dosis y vía de administración

Vía de administración oral.

- Dosis del principio activo:

Perros: 5 – 20 mg/Kg de peso corporal una vez al día por 7-10 días. La dosis puede ser administrada como una dosis única o dividida en dos dosis iguales, administradas cada 12 horas.

Gatos: 5 mg/Kg de peso corporal una vez al día por 7-10 días. La dosis puede ser administrada como una dosis única o dividida en dos dosis iguales, administradas cada 12 horas. En caso de infección por micoplasmas la duración del tratamiento debe ser de 14 a 21 días.

- Dosis del producto:

Especie	Dosis
Perros	1 a 4 mL cada 5 Kg de peso corporal cada 24 horas* por 7 – 10 días.
Gatos	1 mL cada 5 Kg de peso corporal cada 24 horas* por 7–10 días.

* La dosis puede ser administrada como una dosis única o dividida en dos dosis iguales, administradas cada 12 horas. En caso de micoplasmosis, la duración del tratamiento debe ser de 14 a 21 días.

Especies

Perros y gatos.

Contraindicaciones

- El Enrofloxacino está contraindicado en animales con hipersensibilidad a las quinolonas.
- No administrar a perros de razas pequeñas a medianas menores de 1 año, ni a perros de razas grandes menores de 1 ½ año.
- No administrar a gatos menores a 8 semanas de edad.
- El uso de Enrofloxacino puede generar la formación de cristales en orina, por lo cual se recomienda no administrar en animales deshidratados.
- No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

Efectos adversos y reacciones adversas

- Se han reportado artropatías en animales inmaduros, especialmente en perros. El riesgo de artropatía aumenta cuando se aumenta la dosis, sin embargo también se ha reportado cuando se utilizan las dosis recomendadas en perros.
- Otros efectos adversos que se han descrito en muy raros casos (menos de 1 animal de cada 10.000 animales, incluyendo informes aislados) incluyen vómitos, anorexia, aumento de las enzimas hepáticas, ataxia, convulsiones, depresión, letargo y nerviosismo.

Interacciones

- Los compuestos que contengan cationes di o trivalentes como Aluminio, Calcio, Magnesio, Hierro o Zinc pueden disminuir la absorción de Enrofloxacino. Así, por ejemplo los antiácidos que contengan cationes (Mg^{2+} , Al^{3+} , Ca^{2+}) pueden unir Enrofloxacino e impedir su absorción.
- El Sucralfato puede inhibir la absorción de Enrofloxacino. Se recomienda separar ambas dosificaciones por al menos dos horas.
- El Enrofloxacino administrado con Teofilina puede aumentar sus niveles séricos. En perros el clearance de la Teofilina se redujo en un 43% cuando se administró en conjunto con Enrofloxacino en dosis de 5 mg/Kg cada 24 horas.
- La administración concomitante con otras drogas que tengan metabolismo hepático puede afectar la farmacocinética de una o ambas drogas.

Advertencias y precauciones especiales de uso

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Las fluoroquinolonas, como Enrofloxacino, no deben utilizarse como primera línea de tratamiento, excepto que no exista alternativa terapéutica disponible. Cuando se empleen como segundo tratamiento, deberá ser sobre la base de estudios de susceptibilidad.

Precauciones especiales para el operador

Lavarse las manos después de administrar el producto.

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. No arrojar el envase vacío o con restos de producto, en ríos, lagos o torrentes de agua natural. Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente a menos de 30 °C. No refrigerar ni congelar.

Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 3 meses. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

Condición de venta

Para Chile: Venta bajo receta Médico Veterinaria retenida.

Para Exportación: Venta bajo receta Médico Veterinaria.

Observaciones

AGITAR VIGOROSAMENTE HASTA OBTENER UNA SUSPENSIÓN HOMOGÉNEA
USO VETERINARIO

Registros

Chile: Reg. SAG N° 2038

Costa Rica: Reg. N° MV-6094

Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F-N° 006146/14

Perú: Reg. SENASA F.82.02.I.0386

Rep. Dominicana: Reg. N° 12567

Presentación

Frasco con 20 mL

Incluye jeringa dosificadora.

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.
