

Rostrum® Comprimidos

Antibacteriano de amplio espectro

Rostrum® es un antibacteriano de amplio espectro, recomendado para el tratamiento de infecciones del tracto gastrointestinal, tracto respiratorio, infecciones genitourinarias como nefritis, pielonefritis o cistitis, infecciones cutáneas, infecciones del conducto auditivo externo, otitis, dermatitis y heridas infectadas.



Ficha Técnica

Forma farmacéutica

Comprimido oral.

Acción terapéutica

Antimicrobiano de amplio espectro.

Composición

Cada comprimido contiene:

Enrofloxacin.....50 mg

Excipientes c.s.p.....1 comprimido

Indicaciones de uso

Rostrum®, es un antibacteriano de amplio espectro, recomendado para el tratamiento de:

- Infecciones del tracto gastrointestinal (*Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Proteus* spp.).
- Infecciones del tracto respiratorio (*Pasteurella* spp., *Bordetella* spp., *Klebsiella* spp.).
- Infecciones genitourinarias como nefritis, pielonefritis, cistitis. (*Escherichia coli*, *Corynebacterium pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp. y *Pseudomonas aeruginosa*).
- Infecciones cutáneas.
- Infecciones del conducto auditivo externo y otitis (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp. y *Pseudomonas aeruginosa*).
- Dermatitis, heridas infectadas (*Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp. y *Pseudomonas aeruginosa*).

Vía de administración y modo de empleo

Administrar directamente en la cavidad bucal.

Dosis

1 comprimido de 50 mg/10 Kg de peso al día, por 7 a 10 días, equivalentes a 5 mg/Kg de peso/día/por 7 a 10 días.

Se puede administrar la mitad de la dosis, dos veces al día.

Especies de destino

Perros y gatos.

Contraindicaciones

- El Enrofloxacinó está contraindicado en animales con hipersensibilidad a las quinolonas.
 - No administrar a perros de raza pequeña a mediana, menores de 1 año, ni a perros de razas grandes menores a 1 ½ año.
 - No administrar a gatos menores a 8 semanas de edad.
 - El uso de Enrofloxacinó puede generar la formación de cristales en orina, por lo cual se recomienda no administrar en animales deshidratados.
 - No se recomienda su uso en gestación y/o lactancia.
-

Efectos adversos y reacciones adversas

- Se han reportado artropatías en animales inmaduros, especialmente en perros. El riesgo de artropatía aumenta cuando se aumenta la dosis, sin embargo, también se ha reportado cuando se utilizan las dosis recomendadas en perros.
 - Otros efectos adversos que se han descrito en muy raros casos (menos de 1 animal de cada 10.000 animales, incluyendo informes aislados) incluyen vómitos, anorexia, aumento de las enzimas hepáticas, ataxia, convulsiones, depresión, letargo y nerviosismo
-

Advertencias y precauciones especiales de uso

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Las Fluoroquinolonas, como Enrofloxacinó, no deben utilizarse como primera línea de tratamiento, excepto que no exista alternativa terapéutica disponible. Cuando se empleen como segundo tratamiento, deberá ser sobre la base de estudios de susceptibilidad.
 - Para Costa Rica: Este producto puede producir resistencia a los antimicrobianos.
-

Interacciones

Los compuestos que contengan cationes di o trivalentes como aluminio, calcio, magnesio, hierro o zinc pueden disminuir la absorción de Enrofloxacinó. Así, por ejemplo los antiácidos que contengan cationes (Mg^{2+} , Al^{3+} , Ca^{2+}) se pueden unir a Enrofloxacinó e impedir su absorción.

El Sucralfato puede inhibir la absorción de Enrofloxacinó. Se recomienda separar ambas dosificaciones por al menos dos horas.

El Enrofloxacinó administrado con Teofilina puede aumentar sus niveles séricos. En perros, el clearance de la Teofilina se redujo en un 43% cuando se administró en conjunto con Enrofloxacinó en dosis de 5 mg/kg cada 24 horas.

La administración concomitante con otras drogas que tengan metabolismo hepático puede afectar la farmacocinética de una o ambas drogas.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente a menos de 30 °C. No refrigerar ni congelar.

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos.

Condición de venta

- Para Chile: Venta bajo receta Médico Veterinaria retenida.
 - Para Exportación: Venta bajo receta Médico Veterinaria.
-

Observaciones

USO VETERINARIO

Registros

Chile: Reg. SAG N° 602

Rep. Dominicana: Reg. N° 8786

Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F N° 007250/16

Costa Rica: Reg. N° MV-5759

Perú: Registro SENASA F.82.21.I.0385

Presentación

Estuche con 10 comprimidos.

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.
