

Transimed®

Tratamiento de otitis externas y dermatitis.

Transimed® se indica en el tratamiento de otitis externas y dermatitis causadas por hongos, levaduras y bacterias Gram (-).

Ficha Técnica

Forma farmacéutica

Suspensión ótica y tópica.



Acción terapéutica

Tratamiento de otitis externas y dermatitis.

Especies de destino

Perros y gatos.

Composición

Cada 1 mL contiene:

Miconazol Nitrato.....23,0 mg
Prednisolona Acetato.....5,0 mg
Polimixina B Sulfato.....5.000 UI
Excipientes c.s.p.....1 mL

Indicaciones de uso

Transimed® se indica en el tratamiento de otitis externas y dermatitis causadas por hongos, levaduras y bacterias Gram (-).

Vía de administración

Tópica.

Dosis y modo de empleo:

En otitis:

- Limpiar el conducto auditivo externo, con un producto ceruminolítico y antiséptico.
- Instilar 5 gotas de Transimed® en el conducto auditivo externo 2 a 3 veces al día, hasta por 15 días.

En dermatitis:

- Cortar el pelo de la zona afectada y limpiarla.
- Esparcir varias gotas de Transimed® sobre la zona a tratar, 2 a 3 veces al día hasta por 10 días.

Contraindicaciones

- No usar en animales con el tímpano perforado debido al efecto ototóxico de Polimixina B.
- No usar en hembras preñadas o en lactancia.

Efectos adversos y reacciones adversas

- El uso de Transimed® por más de 7 días pudiera retrasar la cicatrización de heridas.
- El uso de Transimed® puede asociarse a la aparición de sordera o pérdida parcial de la audición en un pequeño número de perros sensibles (geriátricos). El déficit auditivo usualmente es temporal. Si durante el transcurso del tratamiento se detectan disfunciones vestibulares o de la audición, se debiera descontinuar la terapia y realizar un lavado del conducto auditivo externo.

Interacciones

- La Polimixina B posee interacciones con antibióticos aminoglicósidos, Bacitracina, Quinidina, Quinina.
- El Citrato de Sodio intensifica el potencial nefrotóxico y neurotóxico de la Polimixina B.
- La Succinilcolina y Tubocurarina, pueden prolongar el bloqueo neuromuscular de la parálisis respiratoria asociada con el uso de Polimixina B.

Advertencias y precauciones especiales de uso

- En caso de terapia prolongada (más de 7 días) se debe suspender gradualmente en días sucesivos acorde a lo indicado por el Médico Veterinario tratante.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente a menos de 25 °C. No refrigerar ni congelar. Una vez abierto utilizar el producto dentro de 3 semanas. Descartar el producto in utilizar después de ese período de tiempo.

Precauciones especiales para el operador

- No manipular por personas hipersensibles a los glucocorticoides.
- En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua.
- No manipular por mujeres embarazadas.
- En caso de ingestión, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar etiqueta del producto.

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial.

No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

Condición de venta

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

Observaciones

USO VETERINARIO

USO EXTERNO

AGITAR ANTES DE USAR

Pesentación

15 mL

Registros

Chile: Reg. SAG N° 0526-B
Bolivia: Reg. SENASAG PUV-N° 009803/21

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.
