

# TRIPLEX®



**PRAZIQUANTEL 50 mg, PIRANTEL PAMOATO 150 mg, MEBENDAZOL 200 mg - COMPRIMIDO ORAL**

## Código

401884

## Composición

Cada comprimido oral contiene:

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Praziquantel                      | 50 mg  |
| Pirantel pamoato                  | 150 mg |
| (Equivalente a 52 mg de Pirantel) |        |
| Mebendazol                        | 200 mg |
| Excipientes c.s.p.                | 600 mg |

## Especie de destino

Perros-

## Indicaciones

Antiparasitario oral de amplio espectro. Activo contra nematodos y cestodos.

Nematodos: *Toxacara canis*, *Toxacara catti*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeforme*; *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*.

Cestodos: *Echinococcus granulosus*; *Taenia hydatigena*; *Taenia ovis*, *Taenia pisiformis*, *Taenia taeniaformis*, *Multiceps multiceps*, *Multiceps serialis*, *Mesocestoides spp.*; *Dypylidium caninum*.

## Vía de administración y dosis

Vía oral. Dosis única a razón de 1 comprimido cada 10 kg de peso, equivalente a 20 mg/kg de Mebendazol, 5 mg/kg de Praziquantel y 15 mg/kg de Pirantel pamoato. En parasitosis masivas, se recomienda repetir la dosis al segundo día.

Terapéuticamente, para cortar el ciclo biológico e impedir la reinfestación por *E. granulosus*, otros cestodos y la mayoría de los nematodos, se recomienda repetir el tratamiento a los 28 días.

## Advertencias y precauciones especiales de uso

Debido a que el comprimido solo puede partirse en dos mitades, se recomienda no administrar el producto en perros con un peso menor a 5 kg.

Usar con precaución en pacientes con alteraciones hepáticas o renales.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

## Efectos no deseados y reacciones adversas

Solo se han observado anorexia, vomito, letargia y diarrea en perros tratados.

## Contraindicaciones

No administrar en animales que estén cursando con alteraciones gastrointestinales.

No administrar a cachorros menores de 4 semanas.

## Uso durante preñez y lactancia

No administrar a hembras preñadas.

## Interacciones con otros medicamentos

No usar junto con Levamisol, ya que los efectos anticolinérgicos sobre el huésped pueden sumarse, dando lugar a reacciones colaterales.

## Sobredosis

No se describe.

## Período de eficacia

24 meses.

## Almacenamiento

Mantener a temperatura ambiente (entre 15-30°C), en lugar seco, protegido de la luz, en su envase original, debidamente rotulado y bien cerrado.

## Presentación

Estuche conteniendo blister con 4 comprimidos.

## Condición de venta

Venta bajo receta médico-veterinaria.

## Fabricado por

Laboratorio Ruminal S.A.

## Importado por

Animal Service Latina S.A.

## Distribuido por

Veterquímica S.A.

**USO VETERINARIO**  
**REG. SAG N°1764**

Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero [www.sag.cl](http://www.sag.cl)