

Ursovet®

Tratamiento de enfermedades hepatobiliares inflamatorias que cursan con colestasis hepatobiliar

Ursovet® suspensión oral, está indicado para el tratamiento de enfermedades hepatobiliares inflamatorias que cursan con colestasis hepatobiliar, en perros y gatos. Por sus propiedades coleréticas, citoprotectoras e inmunomoduladoras su uso es útil en cuadros de hepatitis crónica, colangitis, colangiohepatitis y cuadros de colestasis que no cursen con obstrucción biliar.



Ficha Técnica

Forma farmacéutica

Suspensión oral.

Acción Terapéutica

Tratamiento de enfermedades hepatobiliares inflamatorias.

Especies de destino

Perros y gatos.

Composición

Cada 1 mL de suspensión oral contiene:

Ácido Ursodeoxicólico..... 50 mg

Excipientes c.s.p.....1 mL

Indicaciones de uso

Ursovet® suspensión oral, está indicado para el tratamiento de enfermedades hepatobiliares inflamatorias que cursan con colestasis hepatobiliar, en perros y gatos. Por sus propiedades coleréticas, citoprotectoras e inmunomoduladoras su uso es útil en cuadros de hepatitis crónica, colangitis, colangiohepatitis y cuadros de colestasis que no cursen con obstrucción biliar.

Vía de administración

Vía oral.

Dosis del principio activo en perros y gatos

Administrar la dosis indicada cada 24 horas o dividida en dos dosis a intervalos de 12 horas.

Dosis del producto

- Perros: 2 a 3 mL por cada 10 Kg de peso (Equivalentes a 10 a 15 mg/Kg de peso)
- Gatos: 0,2 a 0,3 mL por cada Kg de peso (Equivalentes a 10 a 15 mg/Kg de peso)

Se recomienda que el tratamiento sea administrado por 3 a 4 meses después de que el paciente haya presentado mejoría en los marcadores bioquímicos indicadores de patología hepática. Si es que ha existido mejoría o progresión, el tratamiento debiera ser terminado o complementado con terapias adicionales.

Contraindicaciones

- No utilizar en pacientes que presenten obstrucción biliar, fístula, pancreatitis u otra complicación asociada a colelitiasis.
- No utilizar en pacientes con hipersensibilidad conocida a ácidos biliares.
- No utilizar en conejos u otras especies fermentadoras colónicas. En estas especies el Ácido Ursodeoxicólico es convertido a ácido Litocólico (tóxico).
- Se debe tener especial precaución en pacientes con enfermedad hepática crónica, ya que pueden presentar mayor dificultad en metabolizar ácidos biliares.
- No utilizar en hembras preñadas o engestantes ni durante el período de lactancia.

Efectos no deseados y reacciones adversas

El Ácido Ursodeoxicólico es bien tolerado por perros y gatos. Sin embargo, en algunos casos poco frecuentes, pudieran existir episodios de vómitos y/o diarrea moderada. Los efectos adversos pueden reducirse aumentando gradualmente la dosis hasta la dosis deseada durante 1 a 2 semanas. El tratamiento es de soporte de ser necesario.

Advertencias y precauciones especiales de uso

- Agitar antes de usar
- Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

Precauciones especiales para el operador

No manipular por personas hipersensibles al Ácido Ursodeoxicólico. – En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua. En caso de irritación, acudir a un centro médico y mostrar estuche del producto. – En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar estuche del producto.

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente a menos de 25 °C. No refrigerar ni congelar. Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 3 meses. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo. Para exportación: Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C, protegido de la luz.

Condición de venta

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

Observaciones

USO VETERINARIO

AGITAR ANTES DE USAR

Registros

Chile: Reg. SAG N° 2034

Costa Rica: Reg. N° MV-6133

Uruguay: Reg. MGAP: 2018A00569

Perú: Reg. SENASA F.G7.02.I.0001

Bolivia: Reg. SENASAG PUV-N° 009798/21

Presentación

Frasco con 60 mL

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
Lautaro N° 300 • Quilicura • Santiago • Chile